

DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSAI

Aratás után a következő lépés a tarlóhántás, tarlóápolás, gyomirtózás.

A gabona és repce tarlók hántása és ápolása során védekezünk a parlagfű ellen is. A parlagfű nem csak allergiát okoz több millió embernek, hanem 10-30 %-os termés kiesést is eredményezhet.

A gabona és a repcetartók kezelése fontos növénytermesztési és növényvédelmi technológiai láncszem, és egyben a parlagfű-mentesítés, valamint az évelő gyomnövények elleni védekezésének fontos alapeleme.

A kalászos gabonák betakarítását követően az elhanyagolt tarlókat szőnyegszerűen borítja a parlagfű, esetenként a csattanó maszlag, szerbtövis fajok, árvakelésű napraforgó, kender, ebszékfű az évelők közül pedig a mezei aszat, folyondár szulák, tarackbúza valamint a fenyércirok.

Tarlóhántással a betakarítást követően kelt gyomnövényeket, növényi maradványokat a talajba forgatjuk, ezáltal a kártevőket és a kórokozókat is jelentős mértékben gyérítjük.

A hatékony tarlókezelés a mechanikai és a növényvédőszeres védekezés megfelelő ötvözet.

A tarlóhántás optimális talajművelő eszköze a forgatásos alpművelést végző tárcsa, valamint forgatás nélküli művelés esetén a különböző

A tarlóhántást sekélyen (kb 10-12cm) végezzük és gondoskodni kell a hántolt felszín egy menetben, általában gyűrűs-vagy pálcás hengerrel történő lezárásáról is.

Totális gyomirtózás-ha kell akkor kétszer is.

Ha zömmel évelő egyszikűek vannak a tarlón, akkor a betakarítást követő gyors szalmaeltávolítás után meg kell várni, míg a gyomok elérik a 20-30 cm-es magasságot, és intenzív növekedési szakaszba kerülnek.

Fenyércirok esetében 30-50 cm-es állapotról végezzük el a kezelést.

A parlagfű minél kisebb legyen, virágot és magot ne hozzon, hogy valóban hatékony legyen a kezelés.

Aprószulákról a virágzás, a mezei aszatsnál a tölevélrózsás állapotban van a gyomirtó szer kijuttatásának optimális időpontja.

Gyomirtásra legalkalmasabb a „glifozát” hatóanyagú növényvédőszeres. Szárazabb időjárás esetén segédanyagokat, hatásfokozókat is adagolhatunk: (SPUR)

Ajánlott készítmények:

Figaro 360.

Nem szelektív, szisztémikus herbicid az egyéves s évelő gyomok irtására.

Hatóanyag 360g/l glifozát.

Formuláció: vízdoldható koncentrátum (SL)

Kiszerezés: 20 liter

Növény a hatóanyagot klorofillt tartalmazó zöld részen keresztül veszi fel. A hatóanyag innen transzlokálódik a gyökerekbe, tarackokba, rizómákban.

A tünetek 1-2 hét jelentkeznek öregedésben, törpe növésbe, levél és hajtásbarnulásban. A folyamat visszafordíthatatlan, a kezelt növény elpusztul.

Dózis: Tarló és művelés alatt nem álló mezőgazdasági területek:

Magról kelő egy-és kétszikű gyomok 2-3l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok 4-6l/ha

Víz 150-300l/ha

Forgalmazás 1 liter feletti kiszerezés (20l) II.forg.kat.

Amega Up

Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomok ellen.

Hatóanyag 360g/l glifozát

Formuláció: vízdítható koncentrátum (SL)

Kiszerezés: 1 és 5 liter

Forgalmi kategória: III.

Tarlókezelés: Magról kelő egy-és kétszikű gyomok 2-3l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok 4-6 l/ha

Víz 150-300l/ha

Medallon Premium

Totális hatású gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomnövények ellen.

Hatóanyag: 360g/l glifozát

Formuláció: vízdítható koncentrátum (SL)

Kiszerezés: 1 és 5 liter

Forgalmi kategória: III

A Medallon Premium speciális formuláció, amely a hatóanyagon kívül ionvédelmi rendszert, valamint természetes eredetű tapadásfokozó anyagot-kukorica-glükózt-tartalmaz.

Dózis: szántóföld, tarló kezelés.

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok ellen: 2-3 l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok ellen: 4-6l/ha

Víz: 150-300 l/ha

Totális gyomirtószer adagolása házi kertben: 1,5-2dl/10 víz

Figyelmeztetés!

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a

DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLETBEN!

6760 Kistelek Kossuth u.88