

Délgazda mezőgazdasági szaküzlet növényvédelmi szaktanácsadásai

Őszi vetésű gabonafélék lombtrágyázása és gyomirtása

Az őszi időszakban a csapadékhiány okozott nagy nehézségeket az őszi gabonák vetésének. Az állomány sok helyen nehezen kelt, nem tudott elegendően megerősödni, így ment a télbe, az egyenletes hótakaró hiánya pedig tovább rontott a helyzeten. A rendszeres lombtrágyázás a gabonanövényeinket folyamatosan jó kondícióban tartja. A levélen keresztüli tápanyag-utánpótlással valójában a növény életfolyamatait aktiváljuk, így azonnali segítséget biztosít tápanyaghiány vagy növényi stressz (szárazság) esetén. A lombtrágyák hatására javulhat a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel is. A hiánytünetek okozta stressz helyzetek így hamarabb megoldódnak.

Lombtrágyázásra a kora reggeli órák a kedvezőek, mert ilyenkor a növény gázcserenyílásai megmegnyitva vannak, a levelek kültakarója a harmat miatt fellazult állapotban van, így a megfelelő időpontban végzett lombtrágyázással több tápanyag hasznosul és a levélzet károsodásának esélye is jelentősen csökken. A kijuttatás során javasolt vízmennyiség 250-300 l/ha. Egyes lombtrágyákat növényvédő szerekkel együtt is kijuttathatunk, ilyenkor érdemes 500 literre emelni a hektáronkénti vízmennyiséget. Keverés előtt végezzen keverési próbát és győződjön meg róla, hogy a szerek kompatibilisek! Kelátokat tartalmazó termékek nem keverhetők réztartalmú szerekkel!

AZOSPEED

Az AZOSPEED folyékony fejtrágya a leghatékonyabb és a leggyorsabb megoldás, használata tartós és gyors hatású. Nitrogén mellett, kén és magnéziumot is tartalmaz. Őszi –tavaszi gabonában bármely fenológiai időszakban korlátozás nélkül felhasználható, növényvédelmi munkákkal egy menetben.

Dózis: fejtrágyázás kiegészítése esetén (Pétisó-Ammónium nitrát) 10l/ha. Önállóan alkalmazva 15-20 l /ha.

MIKRAMID D 45% nitrogén (bor, réz, vas, mangán, molibdén, cink)

A Mikramid a növények levelén keresztül is könnyen felszívódik, ezért egyaránt alkalmazható talaj-, fej- és lombtrágya formájában. Más műtrágyákkal és növényvédőszerekkel is keverhető. Vízben gyorsan és maradék nélkül oldódik. Probakeverés ajánlott! Őszi búza lombtrágyaként 2-3 l/ha dózisban a szármegnyúlás kezdetétől virágzásig. Keverés: Előbb a műtrágyát, aztán a növényvédőszert öntsük közvetlenül a tartályba, folyamatos kevergetés mellett! Nehéz dolgunk lesz a kalászosok növényvédelmével! Az őszi csapadékhiány a kalászosok lassú kezdeti fejlődését és az őszi bokrosodás elmaradását eredményezte. A szárazság megkérdőjelezi az őszi gyomirtások hatékonyságát, így tavasszal további kezelés válhat szükségessé. A tavaszi gyomirtásnál a ritkább állományok esetén nagyobb figyelmet érdemes fordítani a gyomirtásra. A gabona fenológiájához viszonyítva rugalmas és széles hatásspektrumú terméket válasszunk. Április első felében már jelen vannak a megszokott gyomok (pipacs, zsombor, tyúkhúr, mezei acat, ragadós galaj, napraforgó árvakelés) amely komplex problémát vet fel.

GRANSTAR SUPER STAR gyomirtó szer rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a fent említett problémákra megoldást jelentenek. Kíméletes, rugalmas, akár a zászlóslevél kiterüléséig felhasználható.

A termékkombinációnak nincs utóvetemény korlátozása. Felhasználás: A készítményt állományban kell kijuttatni a kalászosok 3 leveles állapotától a zászlóslevél kifejlődésig (zab 2 nódusz). A gyomok 2-4 valódi leveles korukban, a galaj 2-6 levélörvös fejlettségékor, az acat tőlevélrózsás állapotban a legérzékenyebb a készítményre. A gyomirtó hatásfokozására a permetléhez 0,1%-os koncentrációban **TREND 90** nedvesítőszer hozzáadása szükséges. Az egységcsomag 4 ha kalászos gabona kezelésre elegendő.

GRANSTAR SUPER 50 SX

Látványos, gyors gyomirtó hatással rendelkezik. A kezelt gyomnövények teljes pusztulása lényegesen rövidebb idő alatt következik be. A készítmény őszi és tavaszi kalászosokban tavasszal a fagyok megszűnését követően a zászlósleveles korig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és a dózist a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. Dózis: 40-60 gramm/ha

GRANSTAR 50 SX

Felhasználható őszi-és tavaszi kalászosokban tavasszal a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlósleveles koráig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. Dózis: 25-40 gramm/ha. Hatásfokozás érdekében a permetléhez 0,1%-os **TREND 90** nedvesítőszer hozzáadása szükséges.

NUANCE 750 WG

A készítmény őszi- és tavaszi kalászosokban (búza, őszi árpa, tavaszi árpa, zab, rozs, tritikále) tavasszal a fagyok megszűnését követően a kalászosok zászlós leveles koráig (zab esetében 2 nóduszig) alkalmazható. A kezelés időpontját és dózist a gyomnövények fejlettsége és a gyomfajok összetétele határozza meg. Dózis: 10-25 gramm/ha. A hatásfokozás érdekében a permetléhez segédanyag, nedvesítő szer hozzáadása szükséges!

TBM 75 WG

A készítményt kora tavasszal a fagyok megszűnését követően állományban a gyomnövények 2-4 leveles fejlettségénél kell kipermetezni. A készítmény már 5 Celsius felett kifejti a hatását. Felhasználható: őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, rozs, tritikále (zab esetén 2 nóduszig) a zászlós leveles korig. Dózisa: 15-20 gramm/ha. A gyomirtó hatás fokozására hatásfokozó adalékanyaggal (Silico) kombinációban célszerű kijuttatni. A gyomirtó szer kipermetezését követő 60 nap múlva zöldségfélék kivételével bármilyen szántóföldi növénykultúra vethető.

Környezet szennyezés elkerülése végett a növényvédőszereket biztonságosan kell használni!

Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! Az elsodródás veszélye miatt csak szélcsendes időben permetezzük!

A cikkben szereplő termékek megvásárolhatók a **Délgazda Mezőgazdasági Szaküzletben!**

6760 Kistelek, Kossuth u. 88.