

DÉLGAZDA MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET NÖVÉNYVÉDELMI SZAKTANÁCSAI

Ismét időszerű a tarlókezelés

Az évelő gyomnövények tarlón történő vegyszeres kezelése az egyik leghatékonyabb megoldásnak számít a mélyen gyökerező elterjedt fajok ellen. Az évelő gyomokkal fertőzött területek nagysága és a fertőzés erőssége az utóbbi években erősen növekedni látszik. Az olyan évelő gyomnövények, mint a mezei acat, folyondárfélék, fenyércirok, és a nád nagy tömegben hajtottak ki.

Az erős gyomosodás részben az enyhe téllal magyarázható, mivel kemény fagy híján az évelők kitartóképletei (rügyek) szinte károsodás nélkül mentek a , és már jóval a tavaszi növények vetése előtt kihajtottak.

A gabonafélék aratása után a tarlók gyors kizöldülése figyelhető meg, különösen a tarackbúzával és fenyér cirokkal fertőzött területeken. Az aratást akadályozó csapadékos idő miatt a fenyércirok már a búza állományban is jelentősen meg tud erősödni. A jelenlegi időjárási körülmények kiváló lehetőséget kínálnak a hatékony tarlókezelésre, ha a védekezés valamilyen oknál fogva elmarad, akkor a következő évben még az ideinél is erősebb gyomosodással kell majd számolni.

A glifozát tartalmú gyomirtó szereknek tarlón történő felhasználásának elsődleges célja az évelő gyomok valamint a parlagfű irtása. A glifozát jól irtja a tarlón kihajtó egy éves gyomokat is, meggátolva a magérlelést, csökkentve a gyommag felhalmozódást a talajban.

- **Amega Up:** (360g/l glifozát)

Totális hatású, felszívódó gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomok ellen.

Dózis: Tarló: Magról kelő egy-és kétszikű gyomok: 2-3 l/ha

Évelő egy-és kétszikű gyomok: 4-6 l/ha

- **Medallon Premium:** (360g/l glifozát)

Totális hatású gyomirtó szer, évelő és magról kelő gyomnövények ellen.

Medallon Premium: speciális formuláció, amely hatóanyagon kívül ionvédelemi rendszert, valamint természetes eredetű tapadásfokozó anyagot tartalmaz.

Dózis: Tarló: Magról kelő egy és kétszikűek ellen: 2-3 l /ha

Évelő egy-és kétszikűek ellen: 4-6 l/ha

- **Glialka Star:** (360 g/ l glifozát)

Dózis: Tarlókezelés: 2-6 l/ha

A tarló gyomirtásról: Amennyiben kihajtottak az évelő gyomfajok, úgy a vegyszeres védekezésnél a gyomnövények megfelelő fenológiai állapotára kell koncentrálnunk, a tarackbúza esetén a 20—25 cm, fenyércirok esetében a 40-50 cm-es nagyságot, a szulákféléknél a virágzás, mezei aszatnál a tölevél rózsás állapotban van a szisztemikus szer kijuttatásának optimális időpontja. Tovább növelheti a gyomirtó szer hatékonyságát, ha permetlébe szárazabb időjárás esetén további segédanyagokat, hatásfokozókat adagolunk. (Spur, Silwet, Trend90)

Kedvező hatású lehet a gyomirtó szerrel együtt kijuttatott 4kg/ha feloldott nitrogén műtrágya, mert fokozza a gyomok élettevékenységét, így elősegíti a glifozát hatóanyag felszívódását.

A tarlókezelés nem merülhet ki a gyommentesség biztosításában, hanem gondolni kell az utónövények tápanyag igényére is, fontos, hogy a növényi maradványok a talajban élő mikroorganizmusok számára könnyen felvehető és hasznosítható táplálékforrásként elérhető legyen.

Amalgerol a tarlóbontásban tölti be a szerepét.

A bontási folyamat végén felszaporodnak a talajbaktériumok, jelentős a tápelem feltámadás, fokozottan kialakul a morzsalékos talajszerkezet.

Az Amalgerol vegetációs évenkénti adagjuk növény fajtától függetlenül szántóföldi növények esetében 7-8 l/ha, intenzív kertészeti kultúrákban 8-15 l/ha. Ajánlott a vegetációs adag kb: 40%-át a talajba juttatni, kipermetezve és bedolgozva, magágy készítés, vetés, ültetés előtt.

A talajmaradványok gyorsabb bontása miatt praktikus még ősszel további 4-5 l/ha +20kg/ha karbamid együttes adagolásával a területre juttatni és bedogozni.

Alkalmazható még őszi kalászosokban a tarlómaradványok bontásán kívül a biztosabb átteleléshez, gyökérnövekedés elősegítésére 3l/ha dózisban.

Tarlókezelő csomag: Rodeo TF (20liter) + Amalgerol (10liter)

Tarlókezelésnél az évelő gyomok intenzív növekedési, vagy tartaléktápanyagok elraktározásának szakaszában kell kijuttatni. Erős évelő kétszikűek (mezei aszat, stb.) fertőzéskor kombinálhatjuk U-46 M Plus vagy U-46 D Fluid gyomirtókkal .

Dózis: 2-6liter/ha

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kérelmére az engedélyező hatóság engedélyezte a Magyarországon nem engedélyezett DESSICASH 20SL gyomirtó szer szükséghelyzeti forgalomba hozatalát.

Felhasználható: napraforgó, őszi káposztarepce, mustár, olajretek, kukorica (vetőmag) lencse, szója, borsó, valamint vetőmag előállítás céljából termesztett magrépa, lucerna, vöröshere és

fehérhere kultúrákban állományszárításra, földi és légi permetezéssel kijuttatással, további
vetőburgonya kultúrákban állományszárítással földi permetezéssel kijuttatással: 2020 május
25-től 2020.szeptember 21-ig engedélyezi.

**A cikkben szereplő termékek megrendelhetők, megvásárolhatók a Délgazda
Mezőgazdasági Szaküzletben!**

Sikeres kertészkedést kívánnak a Gazdabolt munkatársai!

Kistelek, Kossuth u.88.